

Mortalità Generale nell'ex AS n.7. Anno 2008

Sutera Sardo A., Mazzei A., Di Lorenzo R., Mancuso P., Sirianni N.

Nell'anno 2008 sono pervenute presso il Re.N.Ca.M dell'ASP di Catanzaro 2.207 schede Istat di deceduti, residenti nell'ex AS n.7 di Catanzaro, di cui 1.151 (52,2%) di maschi e 1.056 (47,8%) di femmine.

Tutte le informazioni contenute nelle schede sono state codificate ed inserite in un programma specifico (WSIM- Sistema informatizzato di Mortalità per le Aziende Sanitarie Locali), prodotto dall'Unità Operativa Registro tumori ed Epidemiologia Ambientale, dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, che effettua i controlli di qualità e consente l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Allo scopo di effettuare comparazioni temporo-spaziali, sono stati elaborati tassi grezzi e standardizzati di mortalità per settori e per singole cause.

La popolazione utilizzata per la standardizzazione dei tassi è quella italiana al censimento 2001.

Per la codifica delle cause di morte è stata utilizzata l'ICD-IX (Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte).

I dati riferiti alla Calabria ed all'Italia sono stati rilevati dall'Annuario Statistico Italiano – 2010 - Istat.


La Mortalità Generale nei residenti dell'ex AS n.7 – Anno 2008

Nel Grafico n.1 è indicata la mortalità generale, nei residenti nell'ex AS n.7 nell'anno 2008

Nel 2008, rispetto all'anno precedente, il tasso di mortalità generale registrato è stato complessivamente superiore (T.M. 915,9 vs 904,9) .

Le Malattie del Sistema Circolatorio sono state, in entrambi i sessi, le principali cause di morte nel periodo osservato, come nell'anno precedente, ed hanno provocato un numero maggiore di decessi nelle donne rispetto al sesso maschile; mentre la mortalità per tumore è risultata più elevata tra gli uomini.

Seguono per frequenza le Malattie dell'Apparato Digerente, delle Ghiandole Endocrine ed i Traumatismi ed Avvelenamenti.



Nella Tabella n.1 sono elencate la Prime Cause di Morte e le percentuali sui decessi all'interno di ogni classe d'età, in residenti nell'ex As n.7, nell'anno 2008.

Nel primo anno di vita, la Mortalità Perinatale occupa il primo posto nelle cause di morte.

Nella fascia d'età tra 1 e 24 anni spiccano, per numerosità, i decessi per Cause Accidentali.

Tra 25 e 64 anni i Tumori sono la causa più frequente di decesso nei residenti nel territorio osservato, mentre le malattie del Sistema Circolatorio hanno prevalso nell'età superiore a 64 anni.

Tabella n.1

Prima causa di morte per classi d'età e percentuali sui decessi all'interno di ogni classe d'età.

Anno 2008


| CLASSI D' ETA' | PRIMA CAUSA DI MORTE | N. CASI | % |
|----------------|-------------------------|---------|------|
| <1 | MORTALITA' PERINATALE | 13 | 86,7 |
| 1 - 24 | CAUSE ACCIDENTALI | 6 | 46,2 |
| 25 - 64 | TUMORI | 144 | 48,0 |
| > 64 | MAL. SIST. CIRCOLATORIO | 904 | 47,4 |

Legenda:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Mortalità perinatale | 760 - 779.9 |
| Cause accidentali | 800.0 - 999.9 |
| Tumori | 140.0 - 239.9 |
| Mal. Sist. Circolatorio | 390.0 - 459.9 |

Nel confronto con i dati nazionali e regionali (Istat), relativi all'anno 2007, si riscontra che i quozienti più elevati di mortalità per 100 mila abitanti sono quelli relativi alle Malattie Cardiovascolari, ai Tumori, ed alle Malattie del Sistema Respiratorio.

Nel grafico n.2 si osserva la mortalità per le suddette cause di morte nei territori citati.



In ogni territorio, la prima causa di morte è stata registrata a carico delle Malattie Cardiovascolari, mentre i valori nazionali osservati per i Tumori superano quelli regionali e locali .

E' da tenere presente che tassi grezzi, calcolati rapportando il numero dei decessi osservati per la popolazione complessiva, risentono della struttura per età della popolazione stessa.

Conclusioni

Nei residenti nell'ex AS n.7 la frequenza delle Malattie del Sistema Circolatorio nell'anno 2008 (43,9%) appare diminuita rispetto all'anno 2007 (44,4%), pur restando in assoluto la prima causa di morte tra i residenti. Seguono per numerosità i Tumori (25,2%) che risultano in percentuale maggiore rispetto all'anno precedente (23,6%).

Le Malattie dell'Apparato Respiratorio hanno mantenuto nel biennio percentuali simili (6,7 nel 2007 – 6,6 nel 2008), mentre una lieve riduzione è stata constatata a carico delle Malattie dell'Apparato Digerente (5,8% nel 2007 – 4,8% nel 2008).

Dall'analisi a livello nazionale è stata evidenziata una più elevata mortalità complessiva nelle regioni del Centro e del Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno, dove si riscontrano livelli più bassi di decessi per Tumori sia negli uomini che nelle donne. Al contrario nel nord Italia e nel centro la mortalità per queste cause è più elevata della media nazionale.

Per quanto riguarda i decessi per Malattie del Sistema Circolatorio la situazione è più variabile, si riscontrano valori inferiori alla media nazionale in molte regioni del Mezzogiorno ed in alcune regioni del nord, mentre valori più elevati si registrano in quasi tutte le regioni del Centro ed in alcune regioni del nord.

