

Malattie infettive – Anno 2009

De Vito G. *, Scalise R. *, Colace R. *, A. Mazzei**, Mancuso P.**Sutera Sardo A.**

U.O. Igiene Pubblica* - Epidemiologia e Statistica Sanitaria**

Incidenza Malattie Infettive nell'ex AS n.7. Anno 2009

In Tabella n.1 è indicata la frequenza assoluta di malattie infettive notificate nell'ex AS n.7, nei maschi, per fasce d'età, nell'anno 2009.

Le fasce d'età maggiormente colpite, nei maschi, sono state 0-14 anni (46,4%) e 25-64 (38,1%).

Tabella n. 1

Malattie infettive notificate in residenti nell' ex AS 7, per sesso e fasce d'età - Anno 2009

MASCHI					
PATOLOGIE	0-14	15-24	25-64	65+	TOTALE
BLENORRAGIA	0	0	0	0	0
BRUCELLOSI	0	0	2	0	2
DIARREA INFETTIVA	0	0	0	0	0
EPATITE A	0	0	1	0	1
EPATITE B	0	0	1	0	1
EPATITE NANB	0	1	5	0	6
EPATITE VIR.NON SPEC.	1	0	0	1	2
FEBBRE TIFOIDE	0	1	1	0	2
LEGIONELLOSI	0	0	0	0	0
LEISHMANIOSI CUT.	0	0	0	0	0
LEISHMANIOSI VISC.	0	0	0	1	1
LEPTOSPIROSI	0	0	0	0	0
LISTERIOSI	0	0	0	0	0
MENIG.MENIG.	0	0	0	0	0
MENING.e ENC.VIR.	0	0	1	0	1
MORBILLO	0	0	0	0	0
PAROTITE EPIDERMICA	0	0	0	0	0
PERTOSSE	1	0	0	0	1
RICKETISIOSI	0	2	3	2	7
ROSOLIA	0	0	1	0	1
SALMONELLOSI	8	0	2	1	11
SCARLATTINA	2	0	0	0	2
SIFILIDE	1	0	4	0	5
TUBERCOLOSI EXTRAPOLM.	0	1	3	1	5
TUBERCOLOSI POLM.	0	0	7	1	8
TULAREMIA	0	0	0	0	0
VARICELLA	26	1	1	0	28
TOTALE	39	6	32	7	84

In Tabella n.2 è indicata la frequenza assoluta di malattie infettive notificate nell'ex AS n.7, nelle donne, per fasce d'età, nell'anno 2009.

Tabella n. 2

Malattie infettive notificate in residenti nell' EX AS 7, per sesso e fasce d'età - Anno 2009

FEMMINE					
PATOLOGIE	0-14	15-24	25-64	65+	TOTALE
BLNORRAGIA	0	0	0	0	0
BRUCELLOSI	0	1	0	0	1
DIARREA INFETTIVA	1	0	0	0	1
EPATITE A	0	0	0	0	0
EPATITE B	0	0	0	0	0
EPATITE NANB	0	4	3	0	7
EPATITE VIR.NON SPEC.	0	0	0	0	0
FEBBRE TIFOIDE	1	0	0	0	1
LEGIONELLOSI	0	0	0	0	0
LEISHMANIOSI CUT.	0	0	0	0	0
LEISHMANIOSI VISC.	0	0	1	0	1
LEPTOSPIROSI	0	0	0	0	0
LISTERIOSI	0	0	1	0	1
MENIG.MENIG.	0	0	0	0	0
MENING.e ENC.VIR.	0	0	3	1	4
MORBILLO	0	0	0	0	0
PAROTITE EPIDERMICA	0	0	0	0	0
PERTOSSE	0	0	0	0	0
RICKETISIOSI	0	0	6	1	7
ROSOLIA	0	0	0	0	0
SALMONELLOSI	20	1	1	0	22
SCARLATTINA	6	0	0	0	6
SIFILIDE	0	0	1	0	1
TUBERCOLOSI EXTRAPOLM.	0	0	0	1	1
TUBERCOLOSI POLM.	0	2	6	0	8
TULAREMIA	0	0	0	0	0
VARICELLA	14	2	0	0	16
TOTALE	42	10	22	3	77

Anche nel sesso femminile, la maggior parte delle malattie infettive segnalate si sono concentrate nelle fasce d'età 0-14 anni (54,5) e 25-64 anni (28,6%).

Sul totale dei due sessi, le malattie più frequentemente notificate sono state la Varicella (27,3%), la Salmonellosi (20,5%) e la Tubercolosi Polmonare(9,9%).

Anche nel 2009, come nell'anno precedente, i casi notificati sono stati più numerosi a carico dei maschi.

Nelle Tabelle n.3 e n.4 sono evidenziati i tassi di notifica rilevati nell'ex AS n.7 nell'anno 2009, rispettivamente nei maschi e nelle femmine, per fasce d'età.

Tabella n. 3

Tassi di notifica di malattie infettive in residenti nell'ex AS n.7, per sesso e fasce d'età - Anno 2009

Tassi per 100.000 ab.

MASCHI

PATOLOGIE	0-14	15-24	25-64	65+	TOTALE
BLENORRAGIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRUCELLOSI	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
DIARREA INFETTIVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPATITE A	0,0	0,0	1,6	0,0	0,9
EPATITE B	0,0	0,0	1,6	0,0	0,9
EPATITE NANB	0,0	6,4	7,8	0,0	5,1
EPATITE VIR.NON SPEC.	5,8	0,0	0,0	5,1	1,7
FEBBRE TIFOIDE	0,0	6,4	1,6	0,0	1,7
LEGIONELLOSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEISHMANIOSI CUT.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEISHMANIOSI VISC.	0,0	0,0	0,0	5,1	0,9
LEPTOSPIROSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LISTERIOSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MENIG.MENIG.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MENING.e ENC.VIR.	0,0	0,0	1,6	0,0	0,9
MORBILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAROTITE EPIDERMICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTOSSE	5,8	0,0	0,0	0,0	0,9
RICKETISIOSI	0,0	12,9	4,7	10,2	6,0
ROSOLIA	0,0	0,0	1,6	0,0	0,9
SALMONELLOSI	46,5	0,0	3,1	5,1	9,4
SCARLATTINA	11,6	0,0	0,0	0,0	1,7
SIFILIDE	5,8	0,0	6,2	0,0	4,3
TUBERCOLOSI EXTRAPOLM.	0,0	6,4	4,7	5,1	4,3
TUBERCOLOSI POLM.	0,0	0,0	10,9	5,1	6,9
TULAREMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARICELLA	151,2	6,4	1,6	0,0	24,0
TOTALE	226,8	38,7	49,8	35,8	70,4

La Varicella nel sesso maschile e la Salmonellosi nelle donne hanno fatto registrare i valori più elevati, nell'età tra 0 e 14 anni.

Il tasso di notifica è risultato, complessivamente, maggiore nei maschi rispetto all'altro sesso, anche se, nella prima fascia d'età, il valore rilevato a carico delle donne (255,0) supera quello degli uomini (226,8).

Tabella n. 4

Tassi di notifica di malattie infettive in residenti nell'ex AS n.7, per sesso e fasce d'età - Anno 2009

Tassi per 100.000 ab.

FEMMINE

PATOLOGIE	0-14	15-24	25-64	65+	TOTALE
BLENORRAGIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRUCELLOSI	0,0	6,8	0,0	0,0	0,8
DIARREA INFETTIVA	6,1	0,0	0,0	0,0	0,8
EPATITE A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPATITE B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPATITE NANB	0,0	27,3	6,7	0,0	5,6
EPATITE VIR.NON SPEC.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FEBBRE TIFOIDE	6,1	0,0	0,0	0,0	0,8
LEGIONELLOSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEISHMANIOSI CUT.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEISHMANIOSI VISC.	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8
LEPTOSPIROSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LISTERIOSI	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8
MENIG.MENIG.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MENING.e ENC.VIR.	0,0	0,0	6,7	3,8	3,2
MORBILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAROTITE EPIDERMICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTOSSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RICKETISIOSI	0,0	0,0	13,3	3,8	5,6
ROSOLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALMONELLOSI	121,4	6,8	2,2	0,0	17,7
SCARLATTINA	36,4	0,0	0,0	0,0	4,8
SIFILIDE	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8
TUBERCOLOSI EXTRAPOLM.	0,0	0,0	0,0	3,8	0,8
TUBERCOLOSI POLM.	0,0	13,6	13,3	0,0	6,4
TULAREMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARICELLA	85,0	13,6	0,0	0,0	12,9
TOTALE	255,0	68,1	48,8	11,5	61,9

Nella Tabella n.5 sono messe a confronto frequenze assolute e tassi di notifica dei residenti nell'ex AS n. 7 (2009), in Calabria ed in Italia (2008).

Tab n.5

Frequenza assoluta e tassi di notifica per alcune malattie infettive nei residenti ex AS 7 (2009) e confronto con la Calabria e l'Italia (2008)

Tassi per 100.000 abitanti

PATOLOGIE	Ex AS 7		Calabria		Italia	
	n.casi	t.n.	n.casi	t.n.	n.casi	t.n.
BLENNORRAGIA	0	0,0	2	0,1	221	0,4
BRUCELLOSI	1	0,4	21	1,0	163	0,3
DIARREA INFETTIVA	1	0,4	4	0,2	4770	7,9
EPATITE A	1	0,4	11	0,5	1350	2,2
EPATITE B	1	0,4	11	0,5	855	1,4
EPATITE NANB	13	5,4	15	0,7	266	0,4
EPATITE VIR.NON SPEC.	2	0,8	3	0,1	16	0,0
FEBBRE TIFOIDE	3	1,2	13	0,6	123	0,2
LEGIONELLOSI	0	0,0	4	0,2	1050	1,7
LEISHMANIOSI CUT.	0	0,0	0	0,0	23	0,0
LEISHMANIOSI VISC.	2	0,8	1	0,0	72	0,1
LEPTOSPIROSI	0	0,0	0	0,0	40	0,1
LISTERIOSI	1	0,4	2	0,1	118	0,2
MENIG.MENIG.	0	0,0	2	0,1	162	0,3
MENING.e ENC.VIR.	5	2,1	11	0,5	778	1,3
MORBILLO	0	0,0	13	0,6	5312	8,8
PAROTITE EPIDERMICA	0	0,0	8	0,4	1387	2,3
PERTOSSE	1	0,4	3	0,1	339	0,6
RICKETTSIOSI	14	5,8	38	1,9	128	0,2
ROSOLIA	1	0,4	216	10,8	6183	10,3
SALMONELLOSI	33	13,7	61	3,0	6728	11,2
SCARLATTINA	8	3,3	77	3,8	18135	30,2
SIFILIDE	6	2,5	8	0,4	927	1,5
TUBERCOLOSI EXTRAPOLM.	6	2,5	5	0,2	1137	1,9
TUBERCOLOSI POLM.	16	6,6	43	2,1	3021	5,0
TULAREMIA	0	0,0	1	0,0	43	0,1
VARICELLA	44	18,3	1054	52,5	78616	130,9
TOTALE	159	66,0	1627	81,0	131963	219,8

L'ex AS n.7, nel confronto , come nell'anno precedente, ha fatto evidenziare complessivamente tassi di notifica inferiori.

In tutti i territori la malattia più notificata è stata la Varicella (18,3 nell'ex AS n.7, 52,5 in Calabria, e 139,9 in Italia) che comunque, nel territorio osservato ha fatto registrare valori inferiori a quelli dei territori considerati.

